

脳 BV療法 (維持)

最小 リスク

1クール 3 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
アバスチン注 15mg/kg (day1)																						

脳 BV療法 (再発)

最小 リスク

1クール 2 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン注 10mg/kg (day1)														

脳 TMZ(内服)+BV+RT療法(初発)

最小～軽リスク

day	1	2	3	...	13	14	15	16	17	...	27	28	29	30	31	...	41	42	43	44	45	...	70	
アバスチン注 10mg/kg (day1,15,29,43)																								
テモゾロミド錠 75mg/m ² (day1-42)	6週間内服																							
	ニューモシスチス肺炎予防 バクタミン配合錠 1錠/1× (RT併用時は継続)																							

脳 TMZ(内服)+BV療法(維持)

中～高リスク

1クール 4 週間

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
アバスチン注 10mg/kg (day1,15)																														
テモゾロミド錠 150-200mg/m ² (day1-5)	5日間内服																													
グラニセトン内服ゼリー2mg (1包/1×M)	1	1	1	1	1																									
	ニューモシスチス肺炎予防 バクタミン配合錠 1錠/1× (リンパ球800/μL未満は、800/μL 以上になるまで継続)																													

脳 TMZ(注射)+BV+RT療法(初発)

中② リスク

day	1	2	3	~	13	14	15	16	17	~	27	28	29	30	31	~	41	42	43	44	45	~	70		
アバステン注 10mg/kg (day1,15,29,43)																									
テモダール注 75mg/m ² (day1-42)	6週間投与																								
ニューモシスチス肺炎予防 パクトラミン配合錠 1錠/1× (RT併用時は継続)																									

脳 TMZ(注射)+BV療法(維持)

中② リスク

1クール 4週間																													
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
アバステン注 10mg/kg (day1,15)																													
テモダール注 150-200mg/m ² (day1-5)																													
ニューモシスチス肺炎予防 パクトラミン配合錠 1錠/1× (リンパ球800/μL未満は、800/μL 以上になるまで継続)																													

脳 TMZ(注射)(再発)

中② リスク

1クール 4週間																													
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
テモダール注 150-200mg/m ² (day1-5)																													
ニューモシスチス肺炎予防 パクトラミン配合錠 1錠/1× (リンパ球800/μL未満は、800/μL 以上になるまで継続)																													