腸 mRPMI療法 軽 リスク

													1:	クー	ル	4	遁	[間										—	\neg
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
レボホリナート注 250mg/m² (day1,8,15)																													
フルオロウラシル注 600mg/m² (day1,8,15)																													

腸 sLV5FU2療法 軽 リスク

						1/	–ל	JL	2	涯	問				
						٠,	•	,,,	_	<u> </u>	i i e i				
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
レボホリナート注 200mg/m² (day1)															
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)															
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)															

腸 mFOLFOX6療法 中② リスク

						. 1/	–ל	رال	2	涯	間				
						' '		,,,		,	: (H)				
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オキサリプラチン注 85mg/m² (day1)															
レボホリナート注 200mg/m² (day1)															
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)															
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)															
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2											

腸 FOLFIRI療法 中① リスク

					12	–ל	ル	2	週	間				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											

腸 XELOX療法 中② リスク

	Г							1:	ゥー	ル	3	週	間									
da	ay 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
カペシタビン錠 2000mg/m²/day(day1-14)		•		•		2 <u>i</u>	周間	内	服	•												
オキサリプラチン注 130mg/m² (day1)																					•	シタビン錠 1日量/body <1.36m ² → 2400mg/day
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2																		1.66	6-1.66m ² → 3000mg/day 6-1.96m ² → 3600mg/day ≥1.96m ² → 4200mg/day

腸 mXELIRI療法 中① リスク

								1:	–ל	ル	3	週	間													
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
カペシタビン錠 1600mg/m²/day(day1-14)			•	•	•	2;	周間	内	服																	
イリノテカン注 150-200mg/m² (day1)																					<		2 →	180	0mg/da	
アプレピタントCap 125mg	1																				1.66-	1.96m²	\rightarrow	300	Omg/da Omg/da	y
アプレピタントCap 80mg		1	1																		_ ≧	1.96m ²	² →	360	0mg/da	У

腸 SOX療法 中② リスク

									- 1	クー	ル	3	週	間									1
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
S-1 80mg/m²/day (day1-14)							2	週間	引大	服													
オキサリプラチン注 130mg/m² (day1)																							-1 1日量/body <1.25m ² → 80mg/day
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2																		1	.25-1.5m ² → 100mg/day \ge 1.5m ² → 120mg/day

腸 IRIS療法 中① リスク

												12	–	ル	4	遁	[間											$\overline{}$
da	у 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
S-1 80mg/m²/day (day1-14)		•		•	•	25	周間	引内	服	•				•														
イリノテカン注 125mg/m² (day1,15)																						<1		1 ² ·	→		Omg/	
アプレピタントCap 125mg	1														1						1)mg/)mg/	
アプレピタントCap 80mg		1	1													1	1											

腸 BV+mF0LF0XIRI療法

高 リスク

	1				12	–ל	ル	2	週	間				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン注 5mg/kg (day1)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
オキサリプラチン注 85mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2	2										

12クール施行後BV+sLV5FU2療法継続

腸 BV+mF0LF0X6療法 中② リスク

	_				1/	–ל	ル	2	调	間				
								_		.,-,				
da	y 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン注 5mg/kg (day1)														
オキサリプラチン注 85mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)		2	2											

腸 BV+F0LFIRI療法 中① リスク

					1/	–ל	ル	2	调	間				
							• •	_						
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン注 5mg/kg (day1)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											

腸 BV+sLV5FU2療法 軽 リスク

					1/	—ל	رال	2	涯	問				
					٠,		10	_	,	. IPJ				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アバスチン注 5mg/kg (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)		•												

腸 BV+XELOX療法 中② リスク

									- 1:	クー	ル	3	遁	間								
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カペシタビン錠 2000mg/m²/day(day1-14)	ı		•	,	,	,	25	週間	引大	服	, 	<u></u>	,	'	,							
オキサリプラチン注 130mg/m² (day1)																						カペシタビン錠 1日量/body <1.36m ² → 2400mg/da
アバスチン注 7.5mg/kg (day1)																						1.36-1.66m ² → 3000mg/da 1.66-1.96m ² → 3600mg/da \ge 1.96m ² → 4200mg/da
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2																		

腸 BV+mXELIRI療法

中①リスク

	ſ								- 14	クー	ル	3	遤	[間								\neg
C	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カペシタビン錠 1600mg/m²/day(day1-14)				'	,	,	25	周間	引内	服	,	<u> </u>	,									
イリノテカン注 150-200mg/m² (day1)																						カペシタビン錠 1日量/body <1.36m ² → 1800mg/day
アバスチン注 7.5mg/kg (day1)																						1.36-1.66m ² → 2400mg/day 1.66-1.96m ² → 3000mg/day ≥1.96m ² → 3600mg/day
アプレピタントCap 125m	g	1																				
アプレピタントCap 80mg			1	1																		

腸 BV+SOX療法

中② リスク

									- 1	クー	ル	3	遁	間									İ		
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
S-1 80mg/m²/day (day1-14)						,	25	週間	引大	服															
オキサリプラチン注 130mg/m² (day1)																								量/boo	80mg/day
アバスチン注 7.5mg/kg (day1)																						1.			100mg/day 120mg/day
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2																					

腸 BV+IRIS療法 中① リスク

	ĺ												- 1:	ゥー	-ル	4	週	間											_
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
S-1 80mg/m ² /day (day1-14)			ı				2;	週間	引内	服				1															
イリノテカン注 125mg/m² (day1,15)																									<u></u>	-	80	Omg/	/day
アバスチン注 5mg/kg (day1,15)																						1							/day /day
アプレピタントCap 125n	ng	1														1													
アプレピタントCap 80mg	g		1	1													1	1											

腸 BV+ゼローダ療法

最小 リスク

	Γ								· 1·	クー	ル	3	週	間								
da	ау	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カペシタビン錠 2000mg/m²/day(day1-14)					•		25	週間	引大	服	•	•	,									カペシタビン錠 1日量/body
アバスチン注 7.5mg/kg (day1)																						$<1.36\text{m}^2 \rightarrow 2400\text{mg/day}$ $1.36-1.66\text{m}^2 \rightarrow 3000\text{mg/day}$ $1.66-1.96\text{m}^2 \rightarrow 3600\text{mg/day}$
	,					•			•													≥1.96m ² → 4200mg/day

腸 BV+ロンサーフ療法

最小 リスク

													- 1	ゥー	ル	4	遁	[間											
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ロンサーフ錠 70mg/m²/day(day1-5,8-12)		5	日	間	内朋	艮			í	日	間	内月	艮									ロン	サー	- フ <u>鈑</u>	È 1 E	3量	/boo	dy ver	
アバスチン注 5mg/kg (day1,15)																						1.07	-1.2	23 m	2	\rightarrow	80)mg/ mg/ mg/	day
																						1.38 1.53	3-1.5 3-1.6	3 m 9 m	2	→ →	100 110	mg/o mg/o	day day
																						1.84	-1.9	84 m 9 m 5 m	2	\rightarrow	130	mg/o mg/o mg/o	day
																						2	≧2.1	15 m	l ²	\rightarrow	150	mg/	day

腸 P-mab療法

						1.	–ל	ル	2	週	間				
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注 6mg/kg (day1)															

腸 P-mab+mFOLFOX6療法

中② リスク

						1:	–ל	ル	2	週	[間				
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注 6mg/kg (day1)															
オキサリプラチン注 85mg/m² (day1)															
レボホリナート注 200mg/m² (day1)															
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)															
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)															
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2											

腸 P-mab+FOLFIRI療法

中① リスク

					1:	–ל	ル	2	遁	[間				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注 6mg/kg (day1)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											

腸 P-mab+XELOX療法

中② リスク

									- 1	クー	ル	3	遁]間												
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
カペシタビン錠 2000mg/m²/day(day1-14)			•	•	•	,	25	週間	引大	服	•	•	,	,	•											
オキサリプラチン注 130mg/m² (day1)																						<1	タビン錠 .36m ² -	→ 2	2400mg/	-
ベクティビックス注 6mg/kg (day1)																						1.66-1	.66m² — .96m² — .96m² —	→ 3	3600mg/	day
デカドロン錠4mg (2錠/2×MT)			2	2																						

腸 P-mab+ゼローダ療法

最小 リスク

							1	–ל	ル	3	週	間 -										
day	1	2	3	4 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
カペシタビン錠 2000mg/m²/day(day1-14)					2	週間	内	服													タビン錠 1	
ベクティビックス注 6mg/kg (day1)																				1.36-1 1.66-1	$.66m^2$ → $.96m^2$ →	2400mg/day 3000mg/day 3600mg/day 4200mg/day

腸 P-mab+CPT-11療法

中①リスク

					1/	—ל	بال	2	语	間				
					' '		,,	_	,	.,-,				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベクティビックス注 6mg/kg (day1)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											

腸 C-mab療法

		15	' —,	レ1	追	間	
day	1	2	3	4	5	6	7
アービタックス注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² (day1)							

腸 C-mab+FOLFIRI療法

day1 中①リスク day8 最小リスク

					1	–ל	ル	2	遁	間				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
アービタックス注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² (day1,8)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											

腸 C-mab+CPT-11療法 <A法:6週每>

day1,8,15,22 中①リスク day29,36 最小リスク

												14	–ל	ル	6	调	間										
																_	.1~,										
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	~	22	23	24	~	29	~	36	~	42
アービタックス注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² (day1,8,15,22,29,36)																											
イリノテカン注 100mg/m² (day1,8,15,22)																											
アプレピタントCap 125mg	1							1							1				1								
アプレピタントCap 80mg		1	1						1	1						1	1			1	1						

腸 C-mab+CPT-11療法 <B法:2週每>

day1,15,29 中①リスク day8,22,36,43最小リスク

												13	–ל	ル	7	週	間												
da	/ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	~	15	16	17	~	22	~	29	30	31	~	36	~	43	44	45	~	49
アービタックス注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² (day1,8,15,22,29,36,43)																													
イリノテカン注 150mg/m² (day1,15,29)																													
アプレピタントCap 125mg	1												1						1										
アプレピタントCap 80mg		1	1											1	1					1	1								

腸 RAM+FOLFIRI療法 中① リスク

					1:	–ל	ル	2	遁	間				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
サイラムザ注 8mg/kg (day1)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg		1	1											

腸 AFL+F0LFIRI療法 中① リスク

					1:	–ל	ル	2	週	[間				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ザルトラップ注 4mg/kg (day1)														
イリノテカン注 150mg/m² (day1)														
レボホリナート注 200mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 400mg/m² (day1)														
フルオロウラシル注 2400mg/m² (day1-2)														
アプレピタントCap 125mg	1													
アプレピタントCap 80mg	•	1	1											

陽 (MSI-High) ニボルマブ療法 <2週毎>

						1:	クー	ル	2	遁	間				
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
オプジーボ注 240mg/body (day1)															

陽 (MSI-High) ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

													1	クー	ル	4	遁	間											\neg
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オプジーボ注 480mg/body (day1)																													

陽 (MSI-High) ペムブロリズマブ療法 <3週毎>

最小 リスク

									14	ゥー	ル	3	週	間								
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
キイトルーダ注 200mg/body (day1)																						

陽 (MSI-High) ペムブロリズマブ療法 <6週毎>

最小 リスク

													1:	クー	ル	6	週	間											\neg
	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	• • •	40	41	42
キイトルーダ注 400mg/body (day1)																													

陽 (BRAF陽性) ビラフトビ+メクトビ+C-mab療法

		1/2	,	ıı, 1	は	間	
		' /	•		, <u>, , -</u>	Z I PJ	
day	1	2	3	4	5	6	7
ビラフトビCap 300mg/body/day (day1-7)			連Ⅰ	3 Þ	羽服	Į	
メクトビ錠 90mg/body/day (day1-7)			連Ⅰ	3 Þ	羽服	!	
アービタックス注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² (day1)							

腸 _(BRAF陽性) ビラフトビ+C-mab療法

最小 リスク

		15	, —,	ル 1	退	間	
day	1	2	3	4	5	6	7
ビラフトビCap 300mg/body/day (day1-7)			連Ⅰ	ĦΡ	羽服	Į	
アービタックス注 初回400mg/m ² 2回目以降250mg/m ² (day1)							

腸 (HER2陽性) Tri HER+PER療法

	1クール 3 週間 -																				
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ハーセプチン注 初回8mg/kg、 2回目以降6mg/kg (day1)																					
パージェタ注 初回840mg/body、 2回目以降420mg/body (day1)																					