

腎 トーリセル療法

最小 リスク

|                            |  | 1クール 1週間 |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|                            |  | day      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| トーリセル注<br>25mg/body (day1) |  |          |   |   |   |   |   |   |   |

腎 ニボルマブ療法 <2週毎>

最小 リスク

|                             |  | 1クール 2 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
|                             |  | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| オプジーボ注<br>240mg/body (day1) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

腎 ニボルマブ療法 <4週毎>

最小 リスク

|                             |  | 1クール 4 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                             |  | day       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| オプジーボ注<br>480mg/body (day1) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

腎 ペムブロリズマブ+アキシチニブ療法(Pembro3週毎)

最小 リスク

|                              |  | 1クール 3 週間 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------|--|-----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                              |  | day       | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| キイトルーダ注<br>200mg/body (day1) |  |           |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| インライタ錠<br>10mg/2×MA          |  |           | 連日内服 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

腎 ペムブロリズマブ+アキシチニブ療法(Pembro6週毎)

最小 リスク

|                              |  | 1クール 6 週間 |   |   |     |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|-----------|---|---|-----|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| day                          |  | 1         | 2 | 3 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | ... | 28 | 29 | 30 | 31 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ注<br>400mg/body (day1) |  |           |   |   |     |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| インライタ錠<br>10mg/2×MA          |  | 連日内服      |   |   |     |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

腎 ペムブロリズマブ+レンバチニブ療法(Pembro3週毎)

最小 リスク

|                              |  | 1クール 3 週間 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| day                          |  | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| キイトルーダ注<br>200mg/body (day1) |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| レンビマ錠<br>10mg/2×MA           |  | 連日内服      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

腎 ペムブロリズマブ+レンバチニブ療法(Pembro6週毎)

最小 リスク

|                              |  | 1クール 6 週間 |   |   |     |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--|-----------|---|---|-----|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| day                          |  | 1         | 2 | 3 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 14 | 15 | 16 | 17 | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | ... | 28 | 29 | 30 | 31 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キイトルーダ注<br>400mg/body (day1) |  |           |   |   |     |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| レンビマ錠<br>10mg/2×MA           |  | 連日内服      |   |   |     |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |