

脳 BV療法 (維持)

最小 リスク

1クール 3 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ベバシズマブ注 15mg/kg (day1)																							

脳 BV療法 (再発)

最小 リスク

1クール 2 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ注 10mg/kg (day1)															

脳 TMZ(内服)+BV+RT療法(初発)

最小~軽リスク

	day	1	2	3	...	13	14	15	16	17	...	27	28	29	30	31	...	41	42	43	44	45	...	70	
ベバシズマブ注 10mg/kg (day1,15,29,43)																									
テモゾロミド錠 75mg/m <sup>2</sup> (day1-42)		6週間内服																							
		ニューモシスチス肺炎予防 バクタミン配合錠 1錠/1× (RT併用時は継続)																							

脳 TMZ(内服)+BV療法(維持)

中~高リスク

1クール 4 週間

	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
ベバシズマブ注 10mg/kg (day1,15)																															
テモゾロミド錠 150-200mg/m <sup>2</sup> (day1-5)		5日間内服																													
グラニセトロン内服セ <sup>レ</sup> リ-2mg (1包/1×M)		1	1	1	1	1																									
		ニューモシスチス肺炎予防 バクタミン配合錠 1錠/1× (リンパ球800/μL未満は、800/μL 以上になるまで継続)																													

脳 TMZ(注射)+BV+RT療法(初発)

中② リスク

day	1	2	3	~	13	14	15	16	17	~	27	28	29	30	31	~	41	42	43	44	45	~	70		
ベバシズマブ注 10mg/kg (day1,15,29,43)																									
テモダール注 75mg/m <sup>2</sup> (day1-42)	6週間投与																								
ニューモシスチス肺炎予防 パクトラミン配合錠 1錠/1× (RT併用時は継続)																									

脳 TMZ(注射)+BV療法(維持)

中② リスク

1クール 4 週間																													
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
ベバシズマブ注 10mg/kg (day1,15)																													
テモダール注 150-200mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																													
ニューモシスチス肺炎予防 パクトラミン配合錠 1錠/1× (リンパ球800/μL未満は、800/μL 以上になるまで継続)																													

脳 TMZ(注射)(再発)

中② リスク

1クール 4 週間																													
day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
テモダール注 150-200mg/m <sup>2</sup> (day1-5)																													
ニューモシスチス肺炎予防 パクトラミン配合錠 1錠/1× (リンパ球800/μL未満は、800/μL 以上になるまで継続)																													